

Soutien

Il est possible de soutenir notre association en participant à l'une de nos manifestations ou en nous faisant un don.

Nos coordonnées bancaires :

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers

En faveur de :
Association Espoir
Case postale 5
2114 Fleurier

IBAN : CH08 8026 1000 0119 9943 8

N° de compte postal : 20-7781-5

N° de clearing : 80261

SWIFT-BIC : RAIFCH22261




Association espoir

Case postale 5

2114 Fleurier

www.association-espoir.ch

association.espoir@hotmail.ch



Association en faveur
des enfants atteints de
la maladie de crohn et
de la colite ulcéreuse



L'association

L'association a été créée le 25 mai 2010, sur l'initiative de deux parents touchés de très près par ces maladies chez l'enfant.

En peu de temps, 7 membres très motivés se sont retrouvés pour former le comité.



Le combat

« Espoir » a été créé afin de récolter des fonds en faveur des enfants atteints par la maladie de crohn et la colite ulcéreuse. En effet, les participations aux coûts des traitements médicaux à charge des parents sont très élevées et ne permettent, très souvent, pas à payer des loisirs à leurs enfants.


Qu'est-ce que la maladie de crohn - colite ulcéreuse

Deux maladies font partie des maladies chroniques de l'intestin (MICI) :

La maladie de crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). Lors de ces maladies chroniques – qui durent donc toute la vie – se déclenchent des inflammations dans diverses régions du tube digestif. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de maladies infectieuses. Ni la maladie de crohn, ni la colite ulcéreuse ne sont contagieuses.

Les causes des MICI restent encore obscures de nos jours, bien qu'on sache que les facteurs génétiques, culturels et microbiologiques y jouent un rôle essentiel.

Lors de la maladie de crohn, l'inflammation peut toucher tout l'appareil digestif : la bouche, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon jusqu'à l'anus, tandis que pour la colite ulcéreuse, l'activité inflammatoire a exclusivement lieu dans l'intestin grêle.



La Maladie de Crohn peut affecter simultanément ou successivement un ou plusieurs segment du tube digestif. Elle siège le plus souvent sur le côlon (A), on parle alors d'une colite. Elle peut également siéger sur la partie terminale de l'intestin grêle (B), il s'agit alors d'une iléite. Elle peut enfin s'attaquer aux deux parties (C) on parlera dans ce cas d'une iléo-colite.

Les effets de la maladie

Les enfants et les jeunes souffrant de MICI souffrent fréquemment de maux de ventre aigus qui ont diverses formes (jusqu' à de fortes crampes) et d'une durée plus ou moins longue. En outre, ces douleurs sont toujours associées à une grosse envie d'aller à selle et de diarrhées importantes. L'envie d'aller à selle peut être si forte qu'il est parfois impossible de se retenir. En fonction du degré des maux de ventre et des diarrhées, les victimes sont considérablement limitées dans leur quotidien et dans leurs facultés à se motiver et à se concentrer.

